

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE SOBRE TIKOSYN®

(nombre genérico: dofetilide)

Este folleto contiene información sobre Tikosyn® que es importante que usted conozca. Lea esta información cuidadosamente antes de comenzar a tomar Tikosyn. También léala cada vez que surta su receta de Tikosyn para ver si la información relacionada con su enfermedad ha cambiado. Si tiene alguna pregunta, consulte a su médico o farmacéutico. La información que contiene este folleto no sustituye las indicaciones de su médico.

¿Que es lo más importante que debo saber sobre Tikosyn?

Debido a que los latidos de su corazón son irregulares (es decir, padece fibrilación auricular) y le causan molestias, se le ha recetado Tikosyn para ayudar a que su corazón lata con mayor normalidad. No obstante, en algunos pacientes Tikosyn puede producir un tipo diferente de latido anormal del corazón, lo cual puede resultar peligroso y en raras ocasiones hasta provocar la muerte. Es posible que perciba estos latidos anormales diferentes como latidos rápidos con mareos y desmayos. La posibilidad de que usted padezca este tipo de latido anormal es la razón por la que usted y su médico han determinado si sus síntomas son lo suficientemente molestos como para que comience a tomar Tikosyn.

Estudios clínicos con Tikosyn han demostrado que la mayor manera de reducir las probabilidades de padecer este tipo de latido anormal peligroso es tomar la dosis de Tikosyn indicada en su caso. Este latido anormal, si se presenta, generalmente lo hace durante los primeros días de tratamiento. Por eso debe comenzar a tomar Tikosyn en un hospital o centro médico donde sus latidos del corazón puedan ser monitoreados por profesionales de la salud durante los primeros días. Así podrán asistirlo si surge algún problema. Cuando se inicia la terapia con Tikosyn de este modo, este tipo de latido anormal es poco frecuente y el personal del hospital estará allí para tratarlo si se presenta.

Es importante que al regresar a casa siga tomando la dosis exacta que le recetó el médico. Mientras esté tomando Tikosyn, esté alerta a las señales de que pueda estar teniendo estos latidos anormales diferentes y llame a su médico si esto ocurre. Llame a su médico de inmediato si:

- se desmaya,
- se mareo, o
- tiene latidos cardíacos rápidos.

Si no puede comunicarse con su médico, acuda a la sala de emergencias del hospital más cercano. Lleve las cápsulas de Tikosyn para mostrárselas al médico o enfermero.

También debe llamar inmediatamente a su médico si se presenta alguna de las siguientes afecciones:

- diarrea grave,
- sudor inusual,
- vómito,
- falta de apetito, o
- sed excesiva.

Estas afecciones pueden estimular los latidos anormales diferentes.

Si toma Tikosyn con otros medicamentos, aumentarán las probabilidades de que ocurra este tipo de latido anormal. Estos medicamentos se listan en la sección “¿En qué casos está contraindicado Tikosyn?”.

TIKOSYN® (dofetilide)

Una vez que su médico determine la dosis indicada para usted, tome siempre la cantidad exacta de Tikosyn prescrita. Jamás tome dosis extra ni deje de tomarse su dosis de Tikosyn.

¿Qué es Tikosyn?

Tikosyn es un medicamento que se administra a los pacientes con fibrilación auricular (latidos irregulares del corazón). La fibrilación auricular ocurre cuando ciertas partes del corazón (las cámaras conocidas como aurículas) laten con demasiada rapidez o irregularmente. Cuando esto sucede, el corazón no puede bombear sangre al cuerpo como debería, lo cual puede hacer que usted se sienta débil y cansado o que le falte el aire con facilidad. Es posible que tenga una sensación desagradable en el pecho, como de “aleteo” o “palpitaciones”. La fibrilación auricular se puede revertir (convertir) a un ritmo cardíaco normal mediante una descarga eléctrica o con ciertos medicamentos. Sin embargo, la fibrilación auricular puede recurrir. Tikosyn puede ayudar a que su corazón lata con mayor regularidad y que siga latiendo con regularidad por más tiempo.

¿En qué casos está contraindicado Tikosyn?

Tikosyn no está indicado para todos los pacientes que padecen latidos irregulares del corazón (fibrilación auricular). Por eso es que usted necesita hablar con su médico sobre las ventajas y desventajas de Tikosyn y determinar si sus síntomas son lo suficientemente molestos como para justificar la prescripción de Tikosyn.

No tome Tikosyn si:

- Está tomando los siguientes medicamentos:
 - cimetidina (TAGAMET Y TAGAMET HB)*, medicamento contra la acidez, el malestar estomacal y las úlceras que se vende con y sin receta médica
 - verapamil (CALAN, CALAN SR, COVERA-HS, ISOPTIN, ISOPTIN SR, VERELAN Y VERELAN PM)*, medicamento que se usa para tratar la presión arterial alta y ciertos problemas del corazón
 - ketoconazole (NIZORAL)*, medicamento que se usa para tratar ciertas infecciones fúngicas
 - trimetropina sola (PROLOPRIM Y TRIMPEX)* o la combinación de trimetoprima y sulfametoxazola (BACTRIM Y SEPTRA)*, medicamento que se usa para tratar ciertas infecciones bacterianas
 - proclorperazina (COMPAZINE)*, medicamento que se usa para tratar la náusea y el vómito
 - megestrol (MEGACE)*, medicamento que se usa para tratar ciertos tipos de cáncer o la falta de apetito y baja de peso causadas por el SIDA
 - hidroclorotiazida solamente o la combinación con otras medicinas (por ejemplo ESIDRIX, EZIDE, HYDRODIURIL, HIDRÁULICO-IGUALDAD, MICROZIDE, o ORETIC)*
- tiene problemas renales graves o está en diálisis renal.

Tomar ciertos medicamentos junto con Tikosyn puede aumentar las probabilidades de padecer un ritmo cardíaco anormal peligroso como se explicó en la sección “¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Tikosyn?”. Entre estos medicamentos se encuentran los usados para tratar problemas cardíacos, presión arterial alta, depresión y otros problemas mentales, asma, alergias, fiebre del heno y problemas e infecciones de la piel. Por lo tanto, no olvide informar a su médico sobre todos los medicamentos controlados y de venta libre, vitaminas, suplementos alimenticios y remedios naturales y herbales que esté tomando.

Además, informe a su médico si tiene algún problema del corazón, los riñones o el hígado.

Si está embarazada, debe saber que no se cuenta con información sobre la seguridad de Tikosyn en mujeres embarazadas o si Tikosyn se excreta en la leche materna. Las mujeres que toman Tikosyn no deben amamantar.

No se recomienda administrar Tikosyn a niños.

¿Cómo debo tomar Tikosyn?

Su médico comenzará a administrarle Tikosyn en el hospital y medirá su ritmo cardíaco durante los primeros 3 días de tratamiento. Esto lo permitirá determinar la dosis indicada en su caso. Siempre tome la dosis exacta prescrita por su médico. Nunca cambie su dosis de Tikosyn a menos que su médico se lo indique. Su médico le hará pruebas periódicas para asegurarse de que la dosis que está tomando siempre sea la indicada.

Continúe tomando Tikosyn hasta que el médico indique lo contrario. Continúe tomándolo aun si se siente bien. Sin embargo, nunca tome dosis extra de Tikosyn si no se siente bien.

Tikosyn se administra con o sin alimentos. Sin embargo, es importante tomar Tikosyn a la misma hora todos los días. De este manera asegurará que su corazón reciba un suministro constante del medicamento. Es práctico tomar su dosis de Tikosyn siempre a la misma hora como algo rutinario.

Jamás trate de compensar una dosis de Tikosyn si se le olvidó tomarla a la hora acostumbrada. Esto podría aumentar las probabilidades de que ocurran los latidos anormales del corazón. Si se le olvida tomar su dosis de Tikosyn a la hora acostumbrada, simplemente tome la siguiente dosis normal a la hora programada acostumbrada.

Si toma una dosis mayor de Tikosyn de la que debe, llame a su médico inmediatamente. Si no puede comunicarse con su médico, acuda a la sala de emergencias del hospital más cercano. Lleve las cápsulas de Tikosyn para mostrárselas al médico o enfermero.

¿Qué debo evitar durante el tratamiento con Tikosyn?

Algunos medicamentos pueden aumentar la cantidad de Tikosyn en el organismo (consulte la sección "¿En qué casos está contraindicado Tikosyn?"). Esto puede aumentar las probabilidades de que ocurran los latidos anormales del corazón. No tome Tikosyn con estos medicamentos. Antes de comenzar a tomar Tikosyn informe a su médico sobre todos los medicamentos controlados y de venta libre que está tomando (consulte también la sección "¿En qué casos está contraindicado Tikosyn?"). Una vez que comience a tomar Tikosyn, no comience a tomar ningún otro medicamento nuevo sin consultar antes a su médico.

Lleve una lista de todos los medicamentos y suplementos que toma. Si se hospitaliza o acude a otro médico, infórmele que está tomando Tikosyn y muéstrele la lista de medicamentos que toma. Es importante ofrecerle esta información para asegurarse de que puede continuar tomando esos medicamentos sin peligro.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Tikosyn?

El efecto secundario más grave de Tikosyn, un tipo diferente de latido anormal

del corazón peligroso, se explica en la sección "¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Tikosyn?". Este problema es poco frecuente, aunque cuando ocurre puede ser grave y en raras ocasiones incluso puede provocar la muerte.

Los efectos colaterales más comunes de Tikosyn son dolor de cabeza, dolor de pecho y mareos. Tikosyn también puede causar otros efectos secundarios. Si le preocupan estos u otros efectos secundarios, consulte a su médico.

Puntos importantes sobre Tikosyn

Tikosyn es más eficaz si lo toma según las indicaciones de su médico.

- Tome el medicamento diariamente según las indicaciones de su médico.
- No deje de tomarse ninguna de sus dosis ni tome dosis extra.
- Llame a su médico inmediatamente si siente que su corazón late más rápidamente de manera distinta y padece mareos y desmayos. Estos latidos pueden ser graves y, en raras ocasiones, incluso pueden provocar la muerte.
- Informe a su médico y farmacéutico sobre todos los medicamentos que esté tomando (controlados y de venta libre, así como y remedios naturales o herbales).
- No comience a tomar ningún otro medicamento sin consultar primero a su médico.
- No tome cimetidina (TAGAMET Y TAGAMET HB)*, o verapamil (CALAN, CALAN SR, COVERA-HS, ISOPTIN, ISOPTIN SR o VERELAN Y VERELAN PM)*, o quetoconazole (NIZORAL)*, trimetoprima sola (PROLOPRIM, TRIMPEX)* o en combinación con sulfametoxazola (BACTRIM Y SEPTRA)*, proclorperazina (COMPAZINE)*, megestrol (MEGACE)*, o hidroclorotiazida solamente o la combinación con otras medicinas (por ejemplo ESIDRIX, EZIDE, HYDRODIURIL, HIDRÁULICO-IGUALDAD, MICROZIDE, o ORETIC)*
- Vaya para todos sus chequeos regulares.
- Surta su recta con anticipación.
- No suspenda la administración de Tikosyn sin la aprobación de su médico.

Este folleto ofrece un resumen de la información sobre Tikosyn. Su médico o farmacéutico cuenta con el folleto completo dirigido a profesionales de la salud que usted puede solicitar para leer. Tikosyn se le recetó para la afección específica que usted padece. No lo tome para tratar ninguna otra afección ni se lo dé a otras personas.

* Las marcas registradas mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios.

