

LISTA DE REFERENCIA PARA EL PACIENTE

Es necesario que usted tome Tikosyn todos los días como se lo indica su médico

- Para la mayoría de los pacientes, la dosis es de una cápsula dos veces al día
- No debe olvidarse de ninguna dosis ni tomar una dosis extra
- Acuda a todos sus chequeos médicos periódicos
- Suministre su receta médica a tiempo
- No deje de tomar Tikosyn hasta que su doctor le diga que puede suspender el medicamento
- No debe utilizar este medicamento para cualquier otra condición ni compartirlo con otras personas

Dígale a su médico o farmacéutico los nombres de todos los medicamentos que toma

- Con receta o sin receta
- Remedios naturales o de hierbas
- Vitaminas y suplementos dietéticos

No comience a tomar ningún medicamento nuevo sin decírselo primero a su médico.

NO TOME:

- cimetidine (Tagamet®, Tagamet® HB)*
- verapamil (Calan®, Calan® SR, Covera-HS®, Isoptin®, Isoptin® SR, Verelan®, o Verelan® PM)*
- ketoconazole (Nizoral®)*
- prochlorperazine (Compazine®)*

Llame a su médico inmediatamente si usted

- Se desmaya
- Se siente mareado
- Si el corazón le late rápidamente

Estos síntomas pueden ser graves. Y en algunos casos pueden llegar a causar la muerte.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Tikosyn?

- Los efectos secundarios más graves son los latidos irregulares del corazón. Usted puede sentir que le da vueltas la cabeza o que está a punto de desmayarse
- Otros efectos secundarios comunes causados por Tikosyn son el dolor de cabeza, el dolor en el pecho, o los mareos
- Cuando toma Tikosyn al junto con otros medicamentos, aumenta la posibilidad de desarrollar los síntomas de los latidos irregulares del corazón.

Por favor vea la información completa sobre el producto para el paciente y para recetar encerrada en el bolsillo derecho de Los Recursos Para El Paciente.

- trimethoprim solo (Proloprim®, Trimpex®)* o en combinación con sulfamethoxazole (Bactrim®, Septra®)*
- megestrol (Megace®)*
- hydrochlorothiazide sola o en combinación con otros medicamentos (por ejemplo: Esidrix®, Ezide®, HydroDIURIL®, Hydro-Par®, Microzide™, o Oretic®)*

“¿Se acordó de tomar su Tikosyn®(dofetilide) como le recetó su médico?”

Para más información sobre Tikosyn, por favor llame al 1-877-TIKOSYN (1-877-845-6796) o visite nuestra sitio en internet www.tikosyn.com



* Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

